

Ηπατίτιδα Β

Η **Ηπατίτιδα Β** οφείλεται στον ιό ΗΒV. Είναι πολύ μεταδοτικός (περίπου 100 φορές περισσότερο από τον ιό του AIDS, τον HIV). Μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής, αιματογενώς (πχ από κοινή χρήση σύριγγας, τραύμα κλπ,) και από τη μητέρα στο παιδί κατά την κύηση/τοκετό/γαλουχία. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα μετάδοσης μέσω μολυσμένων αντικειμένων όπως ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες κλπ.

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, θα είναι 1-6 μήνες μετά τη μόλυνση από τον ιό. Μεταξύ άλλων μπορεί να είναι πυρετός, κακουχία, ναυτία/έμετοι, κοιλιακό άλγος, ίκτερος κλπ. Η λοίμωξη κατόπιν μπορεί να επιμείνει σε χρόνια φάση για πολλά χρόνια, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις όπως κίρρωση του ήπατος, ηπατική ανεπάρκεια και καρκίνο του ήπατος.

Υπάρχουν ειδικές αιματολογικές διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Για όσους έχουν εμβολιαστεί, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται αν το επίπεδο των αντισωμάτων είναι ικανοποιητικό, καθώς αυτό φθίνει με την πάροδο του χρόνου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην πρόληψη και διάγνωση της νόσου.