

Ερπητικές λοιμώξεις

Οι ερπητοϊοί μπορεί να προσβάλλουν τη στοματική περιοχή, τα γεννητικά όργανα (ιός του απλού έρπητα 1 και 2) ή να εμφανιστούν ως Έρπης Ζωστήρας. Ο τελευταίος οφείλεται σε ενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς (Varicella-Zoster Virus).

Ο **Επιχείλιος Έρπης** εμφανίζεται περιοδικά ως μικρές, επώδυνες φυσαλίδες, οι οποίες παρέρχονται από μόνες τους μετά από μερικές ημέρες. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός. Τα τοπικά σκευάσματα (κρέμες) δεν είναι αποτελεσματικά. Χρειάζεται αγωγή από το στόμα, ώστε το επεισόδιο να είναι μικρότερης έντασης και διάρκειας.

Ο **Έρπης Ζωστήρ** εμφανίζεται συνήθως μετά τη μέση ηλικία ή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Παρουσιάζεται ως επώδυνες φυσαλίδες πάνω σε ερυθρά βάση, οι οποίες γρήγορα σπάνε και καταλείπουν μικρές πληγές. Μπορεί να προηγηθεί πυρετός, κακουχία και πονοκέφαλος, αρκετές μέρες πριν το εξάνθημα, το οποίο έχει τυπική, ζωστηροειδή κατανομή. Συνήθως εντοπίζεται στον κορμό. Χρειάζεται άμεση έναρξη αντιερπητικής αγωγής (χάπια από το στόμα), ιδίως σε περίπτωση οφθαλμικής εντόπισης.

Για όλους τους ερπητοϊούς υπάρχουν ειδικές εξετάσεις ταυτοποίησης του ιού με χρήση μοριακών τεχνικών υψηλής ακρίβειας.